



- 3 Pararendzina aus Löß, örtlich Sandlöß
- 4a Parabraunerde aus Löß des mittleren Löß-Faziesbereiches
- 4b Schwarzerdeähnlicher Boden aus Löß, tiefreichend humos, Ah-Horizont > 4dm
- 12 Kolluvium, örtl. pseudovergleyt o. vergleyt, aus lehmigen Abschwemmmassen
- 19a Pararendzina aus carbonatreichem Schotter oder Flußmergeldecke
- 62b Kalkgley aus Alm über carbonatreichen Talablagerungen und carbonatreichem Schotter
- 64c Kalkreicher Anmoorgley aus carbonatreichem Schotter mit Flußmergelauflage, z.T. Bachschutt
- 77 Kalkhaltiges Niedermoor über carbonatreichem Schotter

- Ökologischer Feuchtegrad bei Pseudogleyen und Gleyen:
- ▬▬▬▬ mäßig feucht, bedingt ackerfähig, sehr frisch
 - mäßig feucht, nicht mehr ackerfähig, feucht (ohne Horizontalschraffur)
 - Inanspruchnahme der 4-streifig ausgebauten St 2580
 - ▬▬▬▬ Grenze des Untersuchungsgebietes
 - — — — bestehende Straßen

Anhang 3: Bodentypen, M 1:25.000
 (Auszug aus der Standortkundlichen Bodenkarte von Bayern:
 L 7736 Erding, M 1:50.000)

St 2580 Flughafentangente Ost
4-streifiger Ausbau von AS St 2584 bis AS St 2084